

BioRespond[®] Solver


Κρέμα εξωτερικής χρήσης
για το πρόσωπο και το σώμα
με αντικνησμώδεις ιδιότητες



Ο δυνατός λύτης!

BioRespond Solver

I.S.V.C.: Itching-Scratching Vicious Circle blocker



Αξιολόγηση συμπτωματικής αγωγής laurylmacrogol 3% & urea 5% σε 1611 ασθενείς με: ατοπική δερματίτιδα, δερματίτιδα εξ' επαφής, ξηρό έκζεμα, ψωρίαση.¹

Στο τέλος της περιόδου παρατήρησης η κατάσταση του δέρματος κρίθηκε, και από τους γιατρούς και από τους ασθενείς ως «καλη» ή «πολύ καλη» σε σχεδόν το **90%** των περιπτώσεων. Επιπλέον, η αξιολόγηση όσον αφορά την υποχώρηση του κνησμού ήταν σχεδόν ίδια.

Η θέση του laurylmacrogol 3% & urea 5% στην αντιμετώπιση της ατοπικής δερματίτιδας παιδιών και ενηλίκων.²

Ενυδατικά που περιέχουν πολυδοκανόλη είναι αποτελεσματικά στη μείωση των συμπτωμάτων του κνησμού. Τα αντισταμινικά φαίνονται να έχουν πολύ μέτριο έως και καθόλου θεραπευτική αξία στο ατοπικό έκζεμα... Τα νεώτερα αντισταμινικά δεν φαίνονται να έχουν καμία αξία στο ατοπικό έκζεμα...

Αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες στην τοπική χορήγηση Punica Granatum (PFE).³


Το εκχύλισμα Punica Granatum (PFE) αναστέλλει την ενεργοποίηση των MAP-κινασών και του παράγοντα NF-kb.

Αντιφλεγμονώδεις και αναλγητικές ιδιότητες της τοπικής χορήγησης Punica Granatum (PFE) και ελαγικού οξέως.⁴

Τα αποτελέσματα της τοπικής χορήγησης Punica Granatum (PFE) και ελαγικού οξέως αποδεικνύουν ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη θεραπεία φλεγμονωδών δερματικών νοσημάτων.

BioRespond Solver

I.S.V.C.: Itching-Scratching Vicious Circle blocker



Αξιολόγηση συμπτωματικής αγωγής laurylmacrogol 3% & urea 5% σε 1611 ασθενείς με: ατοπική δερματίτιδα, δερματίτιδα εξ' επαφής, ξηρό έκζεμα, ψωρίαση.¹

Στο τέλος της περιόδου παρατήρησης η κατάσταση του δέρματος κρίθηκε, και από τους γιατρούς και από τους ασθενείς ως «καλη» ή «πολύ καλη» σε σχεδόν το **90%** των περιπτώσεων. Επιπλέον, η αξιολόγηση όσον αφορά την υποχώρηση του κνησμού ήταν σχεδόν ίδια.

Η θέση του laurylmacrogol 3% & urea 5% στην αντιμετώπιση της ατοπικής δερματίτιδας παιδιών και ενηλίκων.²

Ενυδατικά που περιέχουν πολυδοκανόλη είναι αποτελεσματικά στη μείωση των συμπτωμάτων του κνησμού. Τα αντισταμινικά φαίνονται να έχουν πολύ μέτριο έως και καθόλου θεραπευτική αξία στο ατοπικό έκζεμα... Τα νεώτερα αντισταμινικά δεν φαίνονται να έχουν καμία αξία στο ατοπικό έκζεμα...

Αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες στην τοπική χορήγηση Punica Granatum (PFE).³

Το εκχύλισμα Punica Granatum (PFE) αναστέλλει την ενεργοποίηση των MAP-κινασών και του παράγοντα NF-kb.

Αντιφλεγμονώδεις και αναλγητικές ιδιότητες της τοπικής χορήγησης Punica Granatum (PFE) και ελαγικού οξέως.⁴

Τα αποτελέσματα της τοπικής χορήγησης Punica Granatum (PFE) και ελαγικού οξέως αποδεικνύουν ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη θεραπεία φλεγμονωδών δερματικών νοσημάτων.

BioRespond[®] Solver

Κρέμα εξωτερικής χρήσης για το πρόσωπο και το σώμα με αντικνησμώνδες ιδιότητες

Συμβάλλει στην αντιμετώπιση του κνησμού, γνωστής ή μη αιτιολογίας και οποιασδήποτε βαρύτητας με ή χωρίς δερματικές εκδηλώσεις.

- **Ατοπική δερματίτιδα**
- **Δερματίτιδα εξ' επαφής**
- **Κνίδωση**
- **Ψωρίαση**
- **Γεροντικός κνησμός**
- **Κνησμός από συστηματικά νοσήματα**

Κατασκευαστής:



Biorespond ΕΠΕ
Λεωφ. Κηφισίας 32
151 25 Μαρούσι
www.biorespond.com

Αποκλειστικός Διανομέας:



Lab. NEWMED Pharmaceuticals LTD
Λεωφ. Κηφισίας 32, 151 25 Μαρούσι
Τηλ. 210 68 32 821, Fax. 210 68 32 841
www.new-med.gr



References

1. Results of a postmarketing drug monitoring survey with a polidocanol-urea preparation for dry, itching skin. Freitag G, Höppner T. Source: Medical Science Department, HERMAL, Reinbek, Germany.
2. 2006 American Academy of Allergy, Asthma and Immunology and the European Academy of Allergy and Clinical Immunology. Diagnosis and treatment of atopic dermatitis in children and adults: European Academy of Allergy and Clinical Immunology/American Academy of Allergy, Asthma and Immunology/PRACTALL Consensus Report
3. Αποτελεσματικότητα του εκυλιάρματος ροβιδού (PFE) και του ναυλονορικού οξέος στην αναστολή της ακτινικής δερματίτιδας ασθενών με πλακώδες καρκίνωμα (SCC) που υποβλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία.

Ξένοα Κ. Τάνγκα Α. Στρατηγός Α. Κατσαρού Α. Κατάμας Α. Φλυέσσα Ο. Κυρούδη Σ. Πρωτόπαππα Ν. Ψωμαδάκη Σ. Ευαγγελίτου Τ. και Κολιάρáκης Ν.

- α) Α' Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική Ε.Κ.Π. Νοσοκομείου ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ
 - β) Τομέας Κλινικής Φαρμακολογίας Φαρμακευτικό Τμήμα Ε.Κ.Π. Αθηνών
 - γ) Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα Νοσοκομείου ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ.
4. J Ethnopharmacol. 2013 Jul 30; 148(3):901-8. doi: 10.1016/j.jep.2013.05.040. Epub 2013 Jun 3
- Topical anti-inflammatory and analgesic activities of standardized pomegranate rind extract in comparison with its marker compound ellagic acid in vivo. Mo J, Panichayupakaranant P, Keawnopparat N, Nitruangiaras A, Reammongkol W. Department of Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkla 90110 Thailand.